

| | |
|-------------------|---|
| العنوان: | التأثير الديموجرافي للإيدز في إفريقيا |
| المصدر: | الدراسات الاعلامية |
| مؤلف: | هيئة التحرير(عارض) |
| المجلد/العدد: | ع76 |
| محكمة: | نعم |
| التاريخ الميلادي: | 1994 |
| الناشر: | المركز العربي الاقليمي للدراسات الاعلامية للسكان والتنمية والبيئة |
| الشهر: | سبتمبر |
| الصفحات: | 86 - 84 |
| رقم MD: | 725809 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | النمو السكاني ، مرض الإيدز ، الدول الإفريقية، التقارير |
| رابط: | https://search.mandumah.com/Record/725809 |

التاثير الديموجرافى للايدز فى افريقيا

تظهر دراسة حديثة أصدرتها الامم المتحدة تحت عنوان الايدز وديموجرافية افريقيا : أن معدلات النمو السكانى ستظل عالية فى كل دول أفريقيا جنوب الصحراء رغم الثمن الباهظ الذى تدفعه تلك الدول كنتيجة لحالات الوفاة من الايدز . فلال مرة يدمج قسم السكان التابع لقسم التحليل الاقتصادى وتحليل المعلومات الاجتماعية وتحليل السياسات فى الامم المتحدة ، التاثير الديموجرافى المحتمل لمرض الايدز ، فى تقديراته نصف السنوية لأعداد السكان وتتضمن تقديرات ١٥ دولة من دول جنوب الصحراء فى أفريقيا وهى : بنين وبوركينا فاسو وبوروندى وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونجو وكوت ديفوار وكينيا ومالاوى وموزمبيق ورواندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وأوغندا وزائير وزامبيا وزيمبابوى .

ويتوقع أن تصل حالات الوفاة نتيجة لوباء الايدز فى هذه البلاد الخمسة عشر إلى ٩ ملايين نسمة بحلول عام ٢٠٠٥ فى ٦١ ٪ من هذه الوفيات ستحدث فى أوغندا أو زائير وتنزانيا وزامبيا وسيصل متوسط العمر المتوقع فى المنطقة بين عامى ٢٠٠٠ و٢٠٠٥ إلى حوالى ٥١,٢ سنة أى أقل بحوالى ٦,٥ عام من المتوقع فى غياب الايدز . وسيصل متوسط العمر فى أوغندا إلى ٤٣,٩ سنة فقط أى أقل بحوالى ١١,١ سنة من المتوقع فى غياب الايدز . وأقل بحوالى ٤,٥ سنة عن متوسط العمر بين عامى ١٩٧٥ - ١٩٨٠ .

وتظهر تلك الارقام أنه على العكس من الخبرة الحديثة تتزايد الوفيات فى الدول الافريقية جنوب الصحراء والاهم أن أكبر تاثيرات وفيات الايدز تحدث فى زهرة أعوام العمل ورعاية الاسرة . مما قد يسبب مشاكل إقتصادية واجتماعية ضخمة . وقد يتاثر حجم وانتاجية القوى العاملة الزراعية والصناعية فى البلاد . مما يهدد الصناعات الحيوية الانتاجية وكذلك الزراعة فى قارة تعاني من نقص مزمن فى الطعام وعدد السعرات الحرارية . أيضا من المتوقع أن تتأثر أنماط رعاية الاطفال والمسنين على حد سواء تأثرا شديدا .

ورغم الضريبة البشرية الباهظة المتوقعة نتيجة للايدز فمن المتوقع حدوث زيادة جوهرية فى تعداد السكان فى الدول الخمس عشرة نتيجة لاستمرار معدلات الخطوبة المرتفعة حتى فى الدول الاربعة التى تعاني أشد المعاناة من الوباء . ويتوقع أن يصل اجمالى تعداد سكان المنطقة عام ٢٠٠٥ إلى ٢٩٧,٩ مليون وهو أكثر من ضعف العدد عام ١٩٨٠ وكان ١٣٨,٤ مليون ، بيد أن هذا الرقم سيقبل بحوالى ١٢,٤ مليون أو (٤ ٪) من الرقم المتوقع فى غياب الايدز .

يمكن الحصول على كتاب الايدز وديموجرافية افريقيا (المبيعات رقم E ٩٤ / ١٣ - ٢) بحوالى ٣٠ دولارا أمريكيا من قسم المبيعات بالامم المتحدة فى نيويورك أو جنيف أو عن طريق الكتابة للمدير ، قسم السكان DESIPA الولايات المتحدة ، نيويورك ، ١٠٠١٧ NY الولايات المتحدة .

حقائق علمية

● من تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان :

من المنتظر أن يصل تعداد سكان العالم عام ١٩٩٤ الى ٥,٧ بليون نسمة ، بينما كان هذا العدد عام ١٩٧٤ - وقت انعقاد مؤتمر السكان العالمى - ٤ بلايين نسمة . وخلال حقبة التسعينات زاد عدد سكان العالم بحوالى ٩٣ مليون نسمة تركزت ٩٣٪ منها في الدول النامية التى يوجد بها عدد كبير من الاطفال والشباب الذين يحتاجون الى الكثير من الخدمات الصحية والتعليمية وفرص التوظيف .

وقد قامت منظمة الأمم المتحدة بوضع ثلاثة تقديرات لتعداد سكان العالم عام ٢٠٢٥ مبنية على تقديرات عدة لمعدلات الخصوبة . ويبلغ أقل هذه التقديرات ٧,٩ بليون نسمة ويبلغ التقدير المتوسط لهذا التعداد ٨,٥ بليون نسمة أما اعلى التقديرات فيصل الى ٩,١ بليون نسمة .

ومن المتوقع أن يصل سكان العالم عام ٢٠٠٠ الى ٦,٢٥ بليون نسمة ، وبحلول عام ٢٠٢٥ سوف يرتفع هذا الرقم الى ٨,٥ بليون نسمة وفى عام ٢٠٥٠ سوف يقفز هذا الرقم الى ١٠ بلايين نسمة .

ويتركز خمس سكان العالم في بلاد مازالت التحولات الديموغرافية فيها في مراحلها الأولى ، وتحتاج هذه البلاد الى اساليب عديدة لمتابعة اتجاهات السكان بطريقة أفضل . وقد أظهرت احصاءات منظمة الأمم المتحدة أن ٤٣٪ من سكان العالم يعيشون في مناطق حضرية و ٧٢٪ منهم يعيشون في مناطق متطورة و ٣٤٪ منهم في مناطق أقل تطوراً وفى عام ١٩٧٥ بلغ تعداد سكان العالم الذين يعيشون في مناطق حضرية ٢٨٪ ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل عام ٢٠٠٥ الى ٥٠٪ وتعتبر أفريقيا وجنوب شرق آسيا من المناطق ذات المستوى الحضارى المنخفض الا أن النمو الحضرى قد بدأ بخطوات سريعة . اما البلاد النامية في أمريكا اللاتينية وغرب اسيا فيظهر فيها مستوى عال من التحضر والنمو السكانى . اما في الصين فإن المستوى الحضارى يعد منخفضاً .

وقد بلغ معدل الزيادة السكانية عام ١٩٧٥ الى ٧٢ مليون نسمة ارتفع عام ١٩٩٢ الى ٩٢ مليون نسمة وسوف يزداد ما بين عام ١٩٩٥ وعام ٢٠٠٠ الى ٩٨ مليون نسمة سنوياً .

● من تقرير مجلس الأمومة والطفولة في مصر :

- ٦٠٪ من سكان مصر أمهات وأطفال .
- ٢٨٪ من سكان مصر أطفال أقل من ١٠ سنوات و ٣٩٪ أطفال بين ١٠ - ١٥ .
- ٧٪ من قوة العمل في مصر أطفال أقل من ١٢ سنة .
- معدل الوفيات بين الاطفال المعاقين تحت ١٥ سنة ١٠٪ .
- معدل الأمية بين السيدات ٤٤٪ في المناطق الحضرية و ٧٥٪ في المناطق الريفية .

د . ماهر مهران

وزير السكان وشئون الأسرة ديسمبر ١٩٩٣

لقد بلغ معدل الخصوبة عام ١٩٦٠ سبعة أطفال للأسرة الواحدة وفي عام ١٩٩٠ انخفض هذا الرقم الى ٣,٨ وفي حالة استمرار هذا المعدل فسوف تصل مصر خلال ١٥ سنة الى الهدف المنشود (طفلين للأسرة الواحدة) .

يمكن أن نقول ايضاً إن معدل المواليد في مصر انخفض عام ١٩٩٣ من ٣٩,٨ لكل ١٠٠٠ سيدة الى ٢٩,٢ مولود لنفس عدد السيدات ويرجع السبب في انخفاض هذا المعدل الى استخدام اساليب منع الحمل التي زاد معدل استخدامها من ٢٤,٢٪ عام ١٩٨٥ الى ٤٧,٦٪ عام ١٩٩٠ .

وقد أظهرت الاحصاءات ان ٥٠٪ من السيدات في سن الاخصاب يستخدمن وسائل منع الحمل . ومن البديهي ان عملية نقل الأخبار بين السيدات ستكون عاملاً رئيسياً نحو انتشار استخدام تلك الموانع والوصول الى نسبة استخدام الموانع المطلوبة وهي ٧٠٪ وبالتالي الوصول الى عدد طفلين لكل أسرة .

وتصل نسبة الوفيات بين النساء الى ٢٥٠ حالة لكل ١٠٠٠٠٠ سيدة وذلك نتيجة لحالات الحمل غير المرغوب فيه وعمليات الاجهاض .